

MAMELDIN

INGREDIENTI: Heracleum Sphondylium, Vitex Agnus Castus, aqua, isopropyl myristate, glycerin, cetearyl alcohol, potassium cetyl phosphate, lanolin, heliathi oleum, ceteareth-20, methylparaben, imidazolidinyl urea, Peg-3-sorbitan, fumed silica.

ACȚIUNE: Principiile active din Heracleum Sphondylium și Vitex agnus Castus au acțiune antiprolactinică locală și corectează dezordinile hormonale între estrogeni și progesteron de la nivelul glandei mamare în care prolactina intervine ca verigă finală în exercitarea acțiunii steroizilor ovarieni. Prin blocarea acțiunii estrogenilor la nivelul receptorilor mamari se reduce efectul acestora asupra canalelor galactofore și asupra permeabilității capilare.

INDICAȚII: Mameldin este indicat în mastodiniile secundare dezechilibrului hormonal estrogen-progestativ, contracepției orale, din primul trimestru de sarcină, din perioada peribubertară și perimenopauzală, din sindromul premenstrual sau din mastopatiile benigne.

MOD DE ADMINISTRARE: Se aplică în strat subțire pe pielea de la nivelul sânilor de 2-3 ori pe zi și se masează până la pătrunderea acestuia în piele.

CONTRAINDICAȚII : Nu există pentru administrarea topică locală.

ATENȚIONĂRI și PRECAUȚII SPECIALE: Principiile active din cele două plante Heracleum Sphondylium și Vitex Agnus Castus pătrund în cantitate mică în circulația generală, iar efectul lor sistemic nu poate fi pus în evidență.

SARCINA și ALĂPTAREA : Mameldin poate fi utilizat fără restricții în timpul sarcinii și alăptării.

MOD DE ADMINISTRARE: Doza recomandată este de 2,5-3 ml unguent care se aplică pe suprafața mamelei și se masează până la intrarea în piele. Se pot face 2-3 aplicații pe zi fie discontinuu (între ziua a 10 și a 25-a a ciclului) în cazul sindromului premenstrual, sau în toate zilele lunii, inclusiv în perioada ciclului, în cazul unei mastodinii incipiente; durata tratamentului poate fi de 3-4 luni sau mai mult în funcție de modul de remitere a simptomatologiei sau poate fi prelungit la nevoie.

REAȚII ADVERSE: Nu au fost semnalate reacții adverse locale sau generale secundare aplicării unguentului Mameldin la nivelul pielii sânilor.

Producător: SC IRCON S.R.L. Iași, Calea Chișinăului, nr.6

Tel/fax: 0332.409746

Email: info@ircon.ro;

URL: www.ircon.ro

Produs avizat de Ministerul Sănătății și Familiei.

Notificarea nr. 47998/13.05.2008

A se citi informațiile de pe etichetă înainte de folosire.

A se păstra la temperaturi sub 25⁰C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după data înscrisă pe ambalaj.